

Автор: В.Е. Безсмертный, директор ФКУЗ «Противочумный Центр» Роспотребнадзора



Заболеваемость чумой, холерой, жёлтой лихорадкой, лихорадкой Лаоса, болезнями, вызванными вирусами Марбург и Эбола и другими инфекционными болезнями, вызываемыми возбудителями I-II групп патогенности.

Периодическая информация №12-01/2015-2016.

Настоящая информация подготовлена на основании электронных сообщений, опубликованных на сайтах ВОЗ и ProMED-mail Международного общества по проблемам инфекционных болезней, которое приводит свои оценки публикациям в различных СМИ и других источниках.

ЧУМА

[Мадагаскар](#)

По информации начальника отдела надзора за болезнями Минздрава Мадагаскара с августа 2015 года в стране погибло от чумы 63 человека. По состоянию на 7 января текущего года было зарегистрировано 174 больных. Мадагаскар информировал ВОЗ о текущей вспышке в сентябре 2015 года.

ХОЛЕРА

Ирак

По информации ВОЗ на 22 ноября 2015 года в стране было зарегистрировано 2810 лабораторно-подтвержденных случаев болезни, вызванной *Vibrio cholera* 01, Инаба.

Правительство Ирака при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ закончили 1-й тур вакцинации с использованием оральной холерной вакцины контингента беженцев и внутренне перемещенных людей в количестве 229 тыс. человек в 62 лагерях с высоким охватом. 2-й тур вакцинации будет осуществлен в декабре 2015 года.

Вакцина Shanchol (производитель Индия) содержит убитые вибрионы различных биотипов серотипов 01 и 0139. Вакцина Дюкорал (производство в Швеция) содержит серотип 01 вместе с рекомбинантной единицей В холерного токсина.

Танзания

Вспышка холеры, начавшаяся в стране в конце августа 2015 года, распространилась на более чем половину территории Танзании. По состоянию на 8 декабря 2015 года в 21-ой из 30 областей страны было зарегистрировано 10 412 случаев холеры и 159 летальных исходов. В столице Дер-эс-Салам с населением 4.4 миллиона человек, зарегистрировано 44 % больных от общей суммы заболевших.

Страны Карибского бассейна

По состоянию на 48 эпидемиологическую неделю 2015 года в трех странах зарегистрировано 30 654 случаев холеры, в том числе на Кубе -65 случаев, Гаити -30080, Доминиканская Республика - 509. Количество случаев зарегистрированных на Гаити составило 98 процентов от общего числа в регионе Карибского бассейна.

ОСПА ОБЕЗЬЯН

Центрально-Африканская Республика

Министр здравоохранения Республики заявил на пресс конференции 14 января текущего года о регистрации нескольких случаев оспы обезьян среди населения префектуры Мбому, где погибли два больных и несколько человек были помещены в карантин.

Директор института Пастера в столице Банту сообщил, что в июне 2010 года у двух подростков в возрасте 14 и 15 лет были выявлены диффузные макуло-папулезные поражения, ассоциировавшиеся с пустулами и корочками. Дети жили в глухой лесной зоне на юге страны, употребляли в пищу мясо дикого грызуна(бемба). Сыпь располагалась на лице, туловище и конечностях.

Руководитель института Пастера сообщил, что филогенетически штамм был идентичен штамму из Демократической республики Конго, циркулирующему в центральной Африке.

Специалисты СДС (США) предприняли попытку определить какие виды грызунов являются резервуаром вируса. Вирус редко передается от человека к человеку , однако в Республике Конго был зарегистрирован документированный пример такой передачи. Обезьяны не являются резервуаром вируса, несмотря на то, что вирус носит название обезьяньего. Как полагают, основным резервуаром вируса являются грызуны, в том числе полосатая бежа, живущая на деревьях (*Funisciurus* sp) и грызуны, живущие на

земле (под *Cricetomys* и *Craphiurus*)