КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ПРИВИВКЕ?

Профилактические прививки проводятся лицам только в период отсутствия острого или обострения хронического заболевания.

Рекомендации родителям до проведения прививки:

- накануне и в течение 2-3 дней после прививки не вводите в рацион питания ребенка новый прикорм или новые продукты питания (блюда). Если ребенок находится на грудном вскармливании – не вводите в свой рацион новые продукты;
- не давайте ребенку и не употребляйте сами, в случае грудного вскармливания, явные аллергены (апельсины, клубника, яйца, шоколад, варенье, мед и др.);
- в период проведения прививок желательно избегать перегревания/переохлаждения организма, оградить ребенка от многочисленных контактов, в том числе с инфекционными больными.

Рекомендации родителям после проведения прививки:

- после проведения прививки (в течение первых 30 минут) не стоит уходить из медицинского учреждения, посидите в коридоре около кабинета. Этого времени будет достаточно для того, чтобы ребенок успокоился после инъекции, а в случае возникновения немедленной аллергической реакции на вакцину – незамедлительно получить медицинскую помощь;
- следите за температурой ребенка и выполняйте рекомендации врача.

ИММУНИЗАЦИЯ – САМАЯ УСПЕШНАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

ИММУНИЗАЦИЯ НЕОБХОДИМА ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА.

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

Министерство здравоохранения Республики

О ПРАВИЛАХ ВАКЦИН

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДЯТСЯ ПРИВИВКИ?

Профилактические прививки проводятся для формировани
организма, так называемого иммунитета, к конкретному возбу
заболевания путем введения вакцины. Профилактические п
ликвидации ряда инфекционных заболеваний.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕ

Каждая страна формирует свой Национальный календ
прививок, включающий перечень инфекционных заболеваний, п
целесообразно сформировать защиту у населения. И в первую о
которые могут иметь массовое распространение на территории ст
тяжело, приводя к значительному количеству осложнений и даже

Национальный календарь определяет порядок и сроки провед
прививок, а также группы физических лиц, подлежащих профила

О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ

Плановая вакцинация согласно Национальному календарю проводится против 12 инфекционных заболеваний (вирусного гепатита В, туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекций, кори, эпидемического паротита, краснухи, гриппа).

Иммунизация по эпидемическим показаниям проводится против 18 инфекционных заболеваний: бешенства, бруцеллеза, ветряной оспы, вирусного гепатита А, вирусного гепатита В, дифтерии, желтой лихорадки, клещевого энцефалита, коклюша, кори, эпидемического паротита, краснухи, лептоспироза, полиомиелита, сибирской язвы, столбняка, туляремии, чумы.

ПРИГЛАШЕНИЕ, СОГЛАСИЕ И ОТКАЗ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКИ

Дата проведения профилактической прививки определяется врачом-специалистом территориальной организации здравоохранения.

Перед проведением профилактической прививки врач:

должен разъяснить необходимость вакцинации, информировать об инфекции, против которой проводится прививка, о названии вакцины, о наличии противопоказаний и возможных побочных реакциях;

уточнит Ваше согласие или согласие законного представителя (один из родителей, усыновителей, попечителей в случае с несовершеннолетними лицами) на проведение прививки, о чем делается отметка в медицинской документации пациента.

Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, пациент или его законный представитель имеет право отказаться от проведения прививки. В этом случае врачом в доступной форме разъясняются возможные последствия такого отказа, отказ оформляется записью в медицинской документации пациента, подписывается пациентом и врачом.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИВИВОК

Индивидуальный подход предусматривает необходимость выбрать оптимальное время, оптимальное иммунобиологическое лекарственное средство (вакцину), чтобы введение вакцины ребенку было максимально эффективно (обеспечило ему длительную и надежную защиту) и максимально безопасно (минимизировало риск побочных реакций, не вызвало серьезных нежелательных реакций).

Для применения этого подхода на практике перед прививкой ребенка обязательно осматривает врач, измеряется температура. По результатам осмотра, опроса родителей, изучения истории развития ребенка, врач делает заключение о конкретной вакцины. Иногда, для решения вопроса о возможност вакцины ребенку, врач назначает дополнительные лабораторные исследования.

В случае отсутствия противопоказаний к вакцинации, врач медицинской карточке пациента, которое является обязательны профилактической прививки.

ЕСЛИ НАРУШЕН ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИВИВКАМ

В случае увеличения интервала между прививками индивидуально: все будет зависеть от величины интервала и той ин прививка проводится. Но, как правило, начинать иммунизаци Однако, значительное увеличение интервалов между прививк тому, что сформированная защита будет менее сильной и длит максимально возможной. Поэтому, целесообразно придерж календаря и приходить на прививки в назначенный день.

КАКИЕ РЕАКЦИИ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕ ПРИВИВО

Современные вакцины являются высокоочищенными лекарственными средствами. Однако, как и любое лекарственн вакцина может вызвать закономерное появление некоторых си активности.

Реакции, сопровождающие процессы в организме после введ обусловлены образованием защитных антител в крови и форми любом случае эти реакции не продолжительны (от нескольких ча и не оставляют последствий для организма. Их можно разделить

- местные – могут проявляться покраснением, уплотне месте введения вакцины;
- общие – могут проявляться повышением температур слабостью, вялостью, плаксивостью и др.

Также выделяют группу серьезных нежелательных реак организме, связанные с вакцинацией и проходящие в рамках па (например, появление инфильтрата более 8 см в месте введения суток или повышение температуры тела выше 40°С, наличие возникают крайне редко – 1 случай на несколько тысяч или миллио

Каждый родитель должен понимать, что количество ос перенесенной инфекции в тысячи, а иногда в десятки тысяч проведенной вакцинации.