

Автор: А. Макеенко, медсестра отделения профилактики



Корь – одна из самых заразных инфекций.

Согласно информационным сообщениям из некоторых регионов Российской Федерации, эпидемиологическая ситуация по кори в настоящее время продолжает оставаться сложной. В связи с близким соседством и миграцией населения по различным причинам (бизнес, туризм, учеба, оздоровление) существует реальная угроза заноса данной инфекции на нашу территорию.

Чаще всего болеют дети. Как правило, ребенок переболевает в возрасте до 4-х лет, после этого у него появляется собственный пожизненный иммунитет.

Сейчас ситуация изменилась, и традиционно детские инфекции «повзрослели». **В первую очередь заражаются непривитые люди или утратившие иммунитет.**

Первым признаком заболевания обычно является повышение температуры тела, которое наступает примерно через 10-12 дней после воздействия вируса и продолжается от 4 до 7 дней. На этой стадии могут отмечаться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Примерно через 3 дня она распространяется по телу, переходит на руки и ноги. Сыпь держится 5-6 дней и затем исчезает.

Корь передается воздушно-капельным путем и поражает только человека. Во внешнюю среду вирус кори выделяется с каплями слизи с верхних дыхательных путей при чихании, кашле, разговоре. С воздушными потоками вирус может проникать в соседние помещения, и даже в помещения расположенные на других этажах. В 30% случаев корь приводит к осложнениям. Наиболее распространенные из них – пневмония, поражение слуха и зрения, в т.ч. и у плода при внутриутробном развитии.

Самое эффективное и оправданное средство борьбы с корью – проведение профилактических прививок.

В Республике Беларусь прививка против кори входит в календарь профилактических прививок и проводится детям в обязательном порядке в возрасте 12 месяцев, 6 лет.

В настоящее время в кабинете иммунопрофилактики поликлиники Речицкой ЦРБ коревой моновакциной проводится дополнительная вакцинация против кори следующих групп населения:

работников организаций здравоохранения и фармацевтических работников;

- работников учреждений дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования;
- работников учреждений с постоянным пребыванием детей и взрослых;
- лиц, выезжающих за пределы страны с целью отдыха, туризма, учебы, трудоустройства и прочего (при обращении в организации здравоохранения);
- контактных лиц в очагах кори (с перечнем профилактических прививок по эпидемическим показаниям);
- других лиц.

Наибольший защитный эффект достигается при проведении профилактических прививок в течение 72 часов после потенциального контакта с заболевшим лицом. Вакцинации подлежат лица, не имеющие документальных сведений о проведенной вакцинации против кори, сведений о наличии защитных уровней антител IgG к вирусу или сведений о ранее перенесенном заболевании, а также имеющие документальные сведения об одной прививке против кори.

Уважаемые жители района, по всем интересующим вопросам просим обращаться в кабинет № 9 поликлиники с 8.30 до 19.00 по будням или по телефону 6 28 40.

Помните, сделав прививку Вы получите стойкий иммунитет и защитите себя и своих близких от болезни.