

Автор: медсестра отделения профилактики поликлиники А.М.Макеенко



Уважаемые взрослые и дети, чтобы избежать грозных инфекционных заболеваний и их осложнений, необходимо быть привитыми от: кори, краснухи, полиомиелита, эпидемического паротита, коклюша, туберкулеза, вирусного гепатита В, дифтерии, столбняка.

Вакцины проходят контроль качества, они высокоэффективны и безопасны.

### В каком возрасте какую прививку нужно сделать:□

- 12 часов – Гепатит В
- 3 – 5 дней – Туберкулеза
- 1 месяц – Гепатита В
- 3 месяца – Дифтерии, Коклюша, Столбняка, Полиомиелита
- 4 месяца – Дифтерии, Коклюша, Столбняка, Полиомиелита
- 5 месяцев – Гепатита В, Дифтерии, Коклюша, Столбняка, Полиомиелита
- 12 месяцев – Кори, Краснухи, Эпидемического паротита
- 18 месяцев – Дифтерии, Коклюша, Столбняка, Полиомиелита
- 24 месяца – Полиомиелита
- 6 лет – Дифтерии, Столбняка, Кори, Краснухи, Эпидемического паротита
- 7 лет – Туберкулеза, Полиомиелита
- 11 лет – Дифтерии
- 13 лет – Гепатита В (для детей, ранее не получивших прививку, трехкратно)
- 14 лет – Туберкулеза
- 16 лет и каждые 10 лет до 66 лет – Дифтерии, Столбняка

