

Автор: Лазакович В.А., врач-эпидемиолог ГУ «Речицкий ЗЦГиЭ»



1.□ Когда начнутся прививки против гриппа?□

Подготовка к проведению иммунизации уже начата. На данный момент проходит этап формирования заявки на приобретение противогриппозной вакцины. В соответствии с заявкой будет приобретено необходимое количество вакцины. Напомню, что для создания иммунной прослойки и предупреждения развития эпидемии гриппа ежегодно необходимо прививать не менее 40 % населения. Решением райисполкома определено количество вакцины, которое должны приобрести предприятия для иммунизации своих сотрудников.

Проведение массовая иммунизация населения против гриппа планируется начать с 01 октября 2014г. Подробности по этому вопросу необходимо уточнять в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства.

2.□ Беспокоит вопрос: во время отпуска не водили ребенка в детский сад, за это время на детский сад наложили карантин по ветряной оспе. Мне нужно выходить на работу и ребенка не с кем оставить. Примут ли его в сад? Что делать?

В соответствии с действующим законодательством при наложении карантина в течение 21 дня в дошкольных учреждениях запрещается прием новых и временно отсутствовавших детей в группы, где зарегистрированы случаи заболевания, запрещается перевод детей из таких групп в другие группы. Каждый подобный случай

нужно рассматривать индивидуально с учетом времени отсутствия ребенка, даты начала карантина, сведений о том, переболел ли ребенок ветряной оспой, а так же данных о прививочном статусе в отношении этой инфекции.

Для того чтобы избежать сложностей, связанных с карантином в дошкольных учреждениях, а так же для защиты своего ребенка от ветряной оспы родители должны подумать о том, чтобы привить ребенка. Для решения этого вопроса необходимо обратиться в лечебно-профилактическое учреждение.

3.□ Почему при наличии всего нескольких гнид моего ребенка не допускают в школу? И как эффективно можно от них избавиться?

В соответствии с действующими документами при выявлении педикулеза в детском учреждении ребенок выводится из коллектива. Допуск ребенка в детское учреждение разрешается после контрольного осмотра.

При обнаружении вшей необходимо принять срочные меры по проведению обработки и предотвращению распространения педикулеза среди окружающих. Населением обработка проводится самостоятельно в домашних условиях. Нужно помнить, что простое мытье головы и обычная стирка белья не способны уничтожить вшей и гниды. Средства для специальной обработки имеются в свободной продаже в аптеках, но применять их нужно только в соответствии с инструкцией. После применения любого противопедикулезного средства гниды (яйца) надо вычесать частым гребешком, так как они плотно прикрепляются к волосам, выделяя клейкое вещество, предварительно сполоснув волосы 5-10% водным раствором столового уксуса. Одним из способов санации детей до 5 лет и детей, имеющих аллергические реакции на лекарственные препараты, является стрижка волос (наголо).

Белье следует прокипятить в 2%-ном растворе соды в течение 15 минут, одежду, не подлежащую кипячению, прогладить горячим утюгом с обеих сторон, особенно на швах, складках, у пояса. При необходимости обработку можно повторить через 7 дней.

Обязательно проверьте, нет ли вшей у других членов семьи. Если есть, то лечиться необходимо одновременно всем зараженным, иначе так и не удастся избавить семью от

напасти.

4. Подскажите, как проявляется туберкулез на ранних стадиях?□

Необходимо обратить внимание на такие симптомы, как кашель более 2 недель, снижение веса, потливость в ночное время, незначительное повышение температуры, быстрая утомляемость. Распознать на ранней стадии туберкулез позволяет флюорография. При профилактических рентгенофлюорографических осмотрах выявляются не только заболевания органов дыхания, но и онкологические заболевания легких, пневмония, сердечно-сосудистые заболевания и др.